



© 2005 Baumschulen Lappen

Fraxinus angustifolia 'Raywood'

Fraxinus angustifolia 'Raywood', (F. oxycarpa 'Flame', F. a. 'Wollastonia'), **Esche 'Raywood'**
(Herbstfärbung) Zone 6b

In Australien selektiert und um 1927 von der Baumschule Notcutt in England verbreitet. Mittelgroßer, schmalkroniger Baum, 15-20 (-25) m hoch und 10-12 (-15) m breit; bis weit in die Krone reichender Stamm; Hauptäste spitzwinklig aufrecht, Seitenäste leicht bogig aufrecht, junge Krone schmal und dicht, später breiter und außen aufgelockert. Die Rinde ist grau und in höherem Alter tief gefurcht. Sommergrüne, gegenständige, 20-30 cm lange Fiederblätter, oberseits glänzend dunkelgrün; Herbstfärbung violett bis bordeauxrot. Die Wurzeln bilden ein Herzwurzelsystem mit vertikal wachsenden Senkern und flachen, weitreichenden Hauptseitenwurzeln. Ein mäßig trockener bis frischer Standort auf nährstoffreichem, sandigem bis lehmigem Boden wird bevorzugt. Gute Verwendung als Straßenbaum, Parkbaum, zur Einzelstellung und für Wohnumfeldprogramme.

Fraxinus angustifolia 'Raywood', (F. oxycarpa 'Flame', F. a. 'Wollastonia')
(couleur automnale) Zone 6b

Sélectionné en Australie et commercialisé aux environs de 1927 par les pépinières Notcutt en Angleterre. Arbre de taille moyenne à couronne étroite, atteignant 15-20 (-25) m de haut et 10-12 (-15) m de large, à flèche terminale, aux branches principales très érigées, aux rameaux latéraux légèrement arqués et érigés, à couronne d'abord étroite et compacte puis plus tard plus large et déployée. Ecorce : grise et, âgée, à profondes rides. Feuilles: caduques, opposées, 20-30 cm de long, pennées, vert foncé brillant, violettes à rouge bordeaux en automne. Système racinaire pivotant à racines secondaires verticales et racines principales latérales largement étalées à plat. Préfère un endroit moyennement sec à frais et un sol riche en substances nutritives, sableux à argileux. A utiliser comme arbre d'alignement, dans les parcs ou isolé dans le cadre d'un programme d'aménagement de l'habitat.

Fraxinus angustifolia 'Raywood', (F. oxycarpa 'Flame', F. a. 'Wollastonia')
(autumn colour) zone 6b

Selected in Australia, it was made popular around 1927 by the Notcutt nursery in England. Of medium size, the tree has a narrow crown and a height of 15-20 (-25)m with a width of 10-12 (-15)m. The trunk reaches well into the crown. The main branches are angular in their tips, the side branches slightly bent although erect. The young crown is narrow and close-set but becomes wider and less dense as it becomes older. The bark is grey and deeply furrowed when fully grown. Glossy, opposite, 20-30cm long leaflets that shimmer dark green on the upper surface. In autumn they become violet through to Bordeaux red. The roots form a system with vertically growing offshoots and flat, far-reaching principle side roots. A moderately dry to fresh location on nutrient-rich, sandy to loamy soil is preferred. The tree is well suited to line streets, for parks, for individual positioning and for residential grounds.

Fraxinus angustifolia 'Raywood', (F. oxycarpa 'Flame', F. a. 'Wollastonia')
(herfstkleur) zone 6b

In Australië geselecteerd en rond 1927 door de boomkwekerij Notcutt in Engeland op de markt gebracht. Middelgrote boom met smalle kroon, 15-20 (-25) m hoog en 10-12 (-15) m breed; met tot in de top opgaande stam; hoofdtakken scherphoekig opgaand, zijtakken licht gebogen opgaand, jonge kroon smal en gesloten, later breder en meer open. De bast is grijs en op hoge leeftijd diep gegroefd. Zomergroen geveerd blad, 20-30 cm lang, bovenkant glanzend donkergroen; herfstkleur violet tot bordeauxrood. Wortelsysteem verloopt vanuit het midden met verticale, naar beneden verder doorgroeiende wortels, vlak ver uitlopende hoofdzijwortels. Een matig droge tot frisse standplaats op voedselrijke, zandige tot leemhoudende bodem heeft de voorkeur. Goede gebruiksmogelijkheden als straatboom, parkboom en als solitair in de tuin.